

CENTRO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Centro de Salud Dr. Robert L. Yeager
50 Sanatorium Road, Edificio D
Pomona, New York 10970
Teléfono: (845) 364-2997 Fax: (845) 364-3658



Public Health
Prevent. Promote. Protect.

EDWIN J. DAY
County Executive

PATRICIA S. RUPPERT, DO, MPH, CPE, DABFM, FAAFP
Commissioner of Health

CHITRA PUNJABI, MD
Director, TB & Communicable Disease

Hoja Informativa de Tratamiento de Gonorrea Información Importante Sobre Su Salud

(Esta hoja informativa de tratamiento es para parejas sexuales de personas con gonorrea)

¿Por qué recibo este medicamento (Cefixime)?

Su pareja sexual ha recibido tratamiento para la gonorrea. La gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) que puede contraer al tener relaciones sexuales (oral, vaginal, o anal) con una persona que ya la tiene. Es posible que haya estado expuesto(a) a una infección por gonorrea. La gonorrea se trata fácilmente con medicina llamada cefixime (también conocida como Suprax). Su pareja sexual le ha dado cefixime, recetada por un proveedor de salud, para tratarlo a usted para gonorrea.

¿Qué es la gonorrea y cuáles son los síntomas?

La gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por una bacteria llamada *Neisseria gonorrhoea*. La gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) curable que usted puede contraer al tener sexo con una persona que ya lo tiene. Muchas personas con gonorrea no saben que lo tienen porque no tienen síntomas y se sienten bien. Algunas personas NO experimentan ningún signo o síntoma.

Síntomas de la gonorrea

Las personas que tienen genitales masculinos pueden notar una secreción (goteo) del pene, dolor o malestar al orinar (orinar) o dolor o hinchazón en los testículos.

Las personas que tienen genitales femeninos pueden notar una secreción vaginal inusual; dolor o ardor al orinar (orinar); una mayor necesidad de orinar; dolor durante las relaciones sexuales; sangrado entre períodos o después de tener relaciones sexuales; dolor o calambres en la parte inferior del abdomen (vientre) o pelvis (cadera). Las personas que tienen útero y ovarios pueden volverse infértiles (no pueden tener hijos) si no reciben tratamiento.

Las personas que reciben sexo anal pueden desarrollar dolor rectal, secreción y/o sangrado rectal.

¿Por qué debo tomar ésta medicina?

Usted necesita tomar la medicina para evitar problemas serios de salud, evitar reinfectar a su pareja, y evitar transmitir la infección a otros. Si en el pasado, usted ha sido diagnosticado y tratado con una infección de transmisión sexual (ITS), se puede infectar otra vez. Si la infección no es tratada, usted puede presentar con:

- Dolor severo en el abdomen (vientre) o recto
- Infertilidad (inabilidad para quedar embarazada)
- Dolor o hinchazón en los testículos
- Aumento de riesgo de embarazo ectópico

- Aumento de riesgo de contraer VIH (virus de inmunodeficiencia humana)
- Aumento de parto prematuro, o infante de bajo peso al nacer u otros daños al feto

¿Esta medicina cura todas las infecciones de transmisión sexual?

No. Esta medicina no cura todas las infecciones de transmisión sexual, pero sí trata la gonorrea, que es la misma infección para la que su pareja ha sido tratada. Si usted tiene síntomas de infección de transmisión sexual, llame a su proveedor de salud, ó puede llamar a la Clínica de Salud Sexual del Departamento de Salud del Condado de Rockland al **845-364-3771** para evaluación.

¿Qué debo hacer después de tomar esta medicina?

Usted y su pareja(s) sexuales no pueden tener sexo oral, anal, o vaginal por siete días luego de completar el tratamiento de cefixime. Si usted y su pareja(s) no esperan al menos siete días, la infección regresará y volverá a afectarlos a los dos y nadie será curado.

¿Cómo me puedo proteger?

Hay varias cosas que usted puede hacer para protegerse de infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea:

- 1) **Hágase la prueba de otras infecciones de transmisión sexual.** Aunque el medicamento que tiene cura la gonorrea, no cura todas las demás infecciones de transmisión sexual. Llame a la Clínica de Salud Sexual del Departamento de Salud del Condado de Rockland al (845) 364-3771 o a su proveedor de salud para averiguar cómo hacerse la prueba de otras ITS, incluido el VIH.
- 2) **Tome la medicina.** Es importante que termine todas las pastillas recetadas. Si la gonorrea no se trata, puede causarle riesgos serios a su salud.
- 3) **Espere a tener relaciones sexuales.** Después de que usted y su pareja tomen el medicamento, espere al menos 7 días antes de tener relaciones sexuales. Esto le da tiempo al medicamento para que actúe. Si tiene relaciones sexuales demasiado pronto, puede volver a infectarse a sí mismo o a su(s) pareja(s).
- 4) **Use un condón o un protector dental.** Cuando se usan correctamente, los condones de látex o poliuretano y los protectores dentales pueden reducir en gran medida el riesgo de contraer ITS, incluida la clamidia. Si está infectado con el VIH o puede haber estado expuesto al VIH, debe comunicarse con su proveedor de salud para un examen completo, que incluya pruebas de ITS y VIH.

Usted ha recibido la medicina “cefixime” para terapia de pareja acelerada. Por favor, lea las siguientes instrucciones ANTES de tomar la cefixime:

SEGURIDAD DE LA CEFIXIME:

Cefixime es segura y muy efectiva si se toma correctamente. Sin embargo, **NO lo tome si cumple alguna de las siguientes condiciones:**

- Usted tiene genitales de mujer y tiene dolor en la parte baja del abdomen, dolor durante las relaciones sexuales, vómitos o fiebre.
- Usted tiene genitales de hombre y tiene dolor o hinchazón en los testículos o fiebre.
- Usted ha tenido una mala reacción, sarpullido, problemas respiratorios, o una reacción alérgica después de haber tomado otros antibióticos. Las personas alérgicas a algunos antibióticos también pueden ser alérgicas a otros tipos. Si tiene alergia a los antibióticos, su proveedor médico debe examinarlo antes de tomar este medicamento.
- Usted tiene una enfermedad grave crónica, como una enfermedad renal, cardíaca o hepática.

- Si usted está tomando otro medicamento recetado, incluido el medicamento para la diabetes, consulte a su farmacéutico o proveedor médico antes de tomar el cefixime para preguntar acerca de las interacciones entre medicamentos.
- Si se presenta alguna de estas circunstancias, o si no está seguro, no tome cefixima. En cambio, debe hablar con su médico o proveedor médico lo antes posible. Su médico o proveedor médico encontrará el mejor tratamiento para usted.
- **ADVERTENCIAS:**
 - Si le practicó sexo oral a alguien que estaba infectado con gonorrea, es posible que el medicamento no funcione tan bien. Necesita ver a un médico para obtener un medicamento más fuerte.
 - Si no toma medicamentos para curar la gonorrea, puede enfermarse gravemente. Si es mujer, puede tener dolor pélvico crónico (a largo plazo) y es posible que no pueda tener hijos.
 - Si está embarazada, busque una evaluación médica antes de tomar el medicamento.

INSTRUCCIONES PARA TOMAR CEFIXIME

- Tome el medicamento por vía oral. No lo compartas con otros.
- DEBE tomar la pastilla que le dieron, cefixima, por vía oral con un vaso de agua lleno, con o sin comida. Al tomar la píldora con comida, es menos probable que tenga malestar estomacal y el medicamento funcionará mejor en su cuerpo. Necesita tomar el medicamento que le dieron para curarse.
- NO tome antiácidos (como Tums, Roloids o Maalox) durante una hora antes o dos horas después de tomar la pastilla de cefixima.
- NO le dé este medicamento a otras personas. Está destinado a las parejas sexuales de personas que tienen gonorrea.

EFFECTOS SECUNDARIOS DE CEFIXIME:

Los posibles efectos secundarios de tomar este medicamento incluyen:

- Leve malestar estomacal
- Diarrea
- Mareos
- Hongo vaginal

Estos son efectos secundarios bien conocidos y no son graves. Muy pocas personas experimentan alguno de estos problemas.

REACCIONES ALÉRGICAS:

Las reacciones alérgicas son raras. Si alguna vez ha tenido una reacción alérgica grave, erupción en la piel, problemas respiratorios, u otras reacciones alérgicas con cefixima u otros antibióticos, consulte a su proveedor médico o farmacia antes de tomar este medicamento.

Las posibles reacciones alérgicas graves incluyen:

- Dificultad para respirar / opresión en el pecho
- Cierre de su garganta
- Hinchazón de sus labios o lengua
- Urticaria (protuberancias o ronchas en la piel que pican intensamente)

**** ¡Si experimenta alguna de estas reacciones alérgicas, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana de inmediato! ****

REANUDAR LA ACTIVIDAD SEXUAL

DEJE de tener relaciones sexuales con otras personas hasta que tome el medicamento y NO tenga relaciones sexuales durante los próximos 7 días después de tomar el medicamento. El medicamento tarda 7 días en actuar en su cuerpo y curar la gonorrea. Si tiene relaciones sexuales sin condón durante los 7 días posteriores a la toma del medicamento, aún podría transmitir la infección a sus parejas sexuales, incluso si no tiene síntomas. Aunque el uso condones correcta y consistentemente es eficaz, la forma más segura de asegurarse de no pasar esta infección a cualquier otra persona es NO tener relaciones sexuales durante 7 días.

Si tiene alguna pregunta sobre la cefixima (Suprax) o la gonorrea, llame a su proveedor de salud o llámenos a la Clínica de Salud Sexual del Departamento de Salud del Condado de Rockland al **845-364-3771**.

PARA INFORMAR A OTRO(A)S PAREJAS SEXUALES DE SU POSIBLE CONDICIÓN:

- Trabaje con nosotros en la Clínica de Salud Sexual del Departamento de Salud del Condado de Rockland para informar a sus parejas sexuales de posible exposiciones a una infección, para que también puedan ser examinados y / o tratados adecuadamente. Llame a la Clínica de Salud Sexual del Departamento de Salud del Condado de Rockland al **845-364-3771**.
- Si tiene acceso a Internet, puede enviar a sus parejas sexuales un mensaje anónimo o confidencial: www.tellyourpartner.org